



# డా. వై.యస్.ఆర్. ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం రైతుల సలహా కేంద్రం

అధిక వర్షాల వలన ఉద్యాన పంటలలో చేపట్టవలసిన నష్ట నివారణ చర్యలు

డా. ఇ.కరుణ శ్రీ  
విస్తరణ సంచాలకులు

డా.ఎల్.నారం నాయుడు  
పరిశోధన సంచాలకులు

డా.టి.జానకిరామ్  
ఉపకులపతి



# అధిక వర్షాలప్పుడు సాధారణంగా తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు

- వీలైనంత త్వరగా చేలల్లో అధికంగా ఉన్న నీటిని తీసివేయాలి.
- పంట ఎదుగుదలకు తోడ్పడే విధంగా బూస్టర్ డోస్ ఎరువులను వేసుకోవాలి.
- అధిక తేమ వలన ఉధృతి పెరిగే అవకాశంగల తెగుళ్ళు మరియు పురుగుల నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి.
- లేత తోటలలో చనిపోయిన మొక్కలను తీసివేసి క్రొత్త మొక్కలను నాటుకోవాలి.
- వర్షాలు తగ్గగానే వీలైనంత త్వరగా చెట్ల మధ్య దున్నడం వలన తేమ త్వరగా ఆరి చెట్లు కోలుకుంటాయి.
- అధిక గాలులకు వేళ్ళతో సహా ఒరిగిన చెట్లను లేపి నిలబెట్టి, మట్టిని ఎగదోసి ఊతమివ్వాలి.



# మామిడి



- ఒరిగిన / పడిపోయిన చిన్న చెట్లను లేపి మట్టిని ఎగదోయాలి.
- విరిగిన కొమ్మలను కత్తిరించి, పైభాగాన బోర్డో పేస్ట్ లేదా కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ ను పూతగా పూయాలి.
- చెట్టు ఒక్కటికి 500గ్రా. యూరియా, 417గ్రా. మ్యూరేట్ ఆఫ్ పోటాష్ మరియు 25కిలోల పశువుల ఎరువును వేయాలి.
- వేర్లను తెగుళ్లు నుండి కాపాడడానికి కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ ను 3గ్రా./లీ చొప్పున మొదళ్ళ వద్ద తడపాలి.
- పక్షి కన్ను తెగులు మరియు పండు కుళ్ళు వంటి తెగుళ్ళ నివారణకు కార్బండిజిమ్ 1గ్రా./లీ చొప్పున కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- పురుగుల నివారణకు డైమిథోమేట్ 2మీ.లీ లేదా క్లోర్ ఫైరిఫాస్ 2.5 మీ. లీ లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారీ చేయాలి.



# మామిడి



- చెట్లు త్వరగా కోలుకోవడానికి పొటాషియం నైట్రేట్ 10గ్రా. మరియు బొరాక్స్ 1.25గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- తోటలలో పిందె రాలుడు నివారణకు ప్లానోఫిక్స్ 20 పి.పి.ఎం (2గ్రా./100లీ ) చొప్పున పిచికారీ చేయాలి.
- కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న పండ్లను వీలైనంత త్వరగా కోసుకోవాలి.
- రాలిన పండ్లను వెంటనే ఏరి శుభ్రం చేసి మార్కెట్ కు పంపాలి లేదా విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులను తయారు చేసుకోవాలి.
- ఈ వర్షాలకు కాయలు లేని తోటలలో దుక్కి చేసుకొనుటకు, ఎరువులు వేసుకొని పచ్చిరోట్ట పైరును విత్తనం చల్లుకోవటానికి ఉపయోగించాలి.
- ఈ వర్షాలకు పండుఈగ ఉద్యతి పెరిగే అవకాశం అధికంగా ఉన్నందున రైతులు తప్పక పండుఈగ ఎరబుట్టలు ఎకరానికి 4 నుండి 5 వరకు పెట్టుకోవాలి.



# అరటి



- తోటలలో నిల్వ ఉన్న నీటిని వీలైనంత త్వరగా బయటకు వెళ్ళదీయాలి .
- విరిగిన చెట్లను రెండు పిలకలు వదిలి కోసివేయాలి.
- చెట్లకు వెదురు కర్రలను పాతి ఊతమివ్వాలి.
- అరటి చెట్లు 4 రోజుల కంటే ఎక్కువ నీటి ముంపుకు గురైతే ఏ వయస్సు తోటలలోనైనా తిరిగి కోలుకోవడం కష్టం.
- ఒకవేళ కోలుకున్న తక్కువ ఎదుగుదల మరియు దిగుబడులు వస్తాయి.
- నీటి ముంపులో తోట 2 రోజులు ఉన్నట్లయితే వీలైనంత త్వరగా నీరు తీసివేసి, తోటలను ఆరేలా చేసి చెట్లు ఒక్కింటికి 100గ్రా.యూరియా, 80గ్రా. పోటాష్ ఎరువులను వేసుకోవాలి.



# అరటి



➤ 3 నెలల వయస్సు కన్నా తక్కువ వయస్సు ఉన్న మొక్కలు 3 అడుగుల లోతు నీటిలో మునిగిపోతే నేల ఆరిన వెంటనే మరలా కొత్త పిలకలను నాటుకోవాలి.

➤ గొర్రుతో అంతర సేద్యం చేసి మొక్కకు 100 గ్రా. యూరియా మరియు 80 గ్రా. మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ ను 2-3 సార్లు 20-25 రోజుల కాలవ్యవధిలో వేయాలి.

➤ ఆకులు, గెలలపై పొటాషియం నైట్రేట్ (13-0-45 (మల్టి-కె)) 5గ్రా. / లీటరు నీటికి చొప్పున వారం రోజుల వ్యవధిలో 3 నుండి 4 సార్లు పిచికారి చేయాలి.

➤ సగం తయారైన గెల (75% లోపు పక్వానికివచ్చినగెల) లను ఎండిన అరటిఆకులతో కప్పి వుంచి 15 రోజుల లోపు కోసి మార్కెట్ చేసుకోవాలి.

➤ వెదురుబొంగులతో ఊతమిచ్చి, మొక్కలు పడిపోకుండా చూసుకోవాలి.

➤ దుంపకుళ్ళు నివారణకు కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ 3గ్రా./ లీటరు నీటికి కలిపి లేదా బోర్డో మిశ్రమం 1 శాతం మొక్క చుట్టూ తడిచేటట్లుగా నేలలో పోయాలి.

➤ సిగటోక ఆకుమచ్చ తెగులును అరికట్టుటకు ప్రొపికోనజోల్ 1 మి.లీ. లేదా మాంకోజెబ్ 2.5 గ్రా./ లీటరు నీటికి కలిపి (1-2 సార్లు వారం రోజుల వ్యవధిలో) పిచికారి చేయాలి.




# బత్తాయి మరియు నిమ్మ



- తోటలలో నిలిచిన నీటిని తీసివేసి, పళ్ళాలలో తిరగవేసి వేరు వ్యవస్థకు ఎండ తగిలేలా చేయాలి.
- పడిపోయిన చెట్లను యధాస్థితికి తెచ్చి, ఊతమిచ్చి కట్టాలి. బయటకు వచ్చిన వేళ్ళపై మట్టిని కప్పి గట్టిగ అదమాలి.
- విరిగిన కొమ్మలను కత్తిరించి, పైభాగాన బోర్డో మిశ్రమం పోయాలి.
- 8సం॥ లు పైబడి, కాపునిస్తున్న తోటలలో చెట్టుకు 500గ్రా. యూరియా మరియు 750గ్రా. పోటాష్ ను వేసుకోవాలి.
- చెట్టు మొదళ్ళ దగ్గర 1% బోర్డో మిశ్రమం లేదా కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 3గ్రా. /లీ నీటికి పోయాలి.
- తోటల్లో కాపు ఉన్నట్లయితే 2-4-D మందును 1గ్రా./100లీ నీటికి చొప్పున లేదా ప్లానోఫిక్స్ 2.5మీ. లీ /10 లీటర్ల నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారీ చేసి పిందె /పండు రాలడాన్ని నివారించుకోవాలి.
- బెంజెల్ అడినైన్ @ 50 PPM పిచికారీ చేయాలి (తద్వారా పత్ర రంధ్రాలు తెరచుకొని, భాష్పోత్సేకం అధికమయి నేలలోని అధిక తేమను నివారించుకోవచ్చు. తరువాత 19:19:19 లేదా పొటాషియం నైట్రేట్ @ గ్రా. /లీ పిచికారి చేయాలి.



# బొప్పాయి



- మొక్క మొదళ్ళ దగ్గర ఉన్న నీటిని తీసివేయాలి.
- మెటలాక్జిల్ ఎం.జడ్ 3గ్రా. లేదా కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 3గ్రా. / లీటరు నీటికి కలిపి మొదళ్ళ దగ్గర పోయాలి.
- సూక్ష్మ పోషకాల మిశ్రమాన్ని 5గ్రా. / లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- కోతకు తయారై ఉన్న కాయలను మార్కెట్ కి తరలించాలి.
- పండు కుళ్ళు నివారణకు హెక్సాకోనజోల్ 2.మి.లీ లేదా డైఫెన్ కొనజోల్ 0.5మి.లీ + 0.5 మి.లీ (స్టికర్) జిగురు మందును కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

# వివిధ కూరగాయ పంటలలో అధిక వర్షాల ప్రభావం

| పంట               | లక్షణాలు                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| టమాట              | మొక్క ఎదుగుదల తగ్గుతుంది, పూత రాలటం, ఎండు తెగులు, ఆకుమచ్చ తెగులు     |
| వంగ               | ఆకులు పసుపుబారటం, పూత రాలటం, అక్షింతల పురుగు, బాక్టీరియా మచ్చ తెగులు |
| మిరప              | నారు కుళ్ళు, ఎండు తెగులు, ఆకుమచ్చ తెగులు, కొయనోఫారా తెగులు           |
| తీగజాతి కూరగాయలు  | ఆకులు పసుపుబారటం, బూజు తెగులు                                        |
| ఆకుకూరలు          | ఆకు తినే పురుగు, ఆకుమచ్చ తెగులు                                      |
| దుంపజాతి కూరగాయలు | అధిక శాఖీయోత్పత్తి, దుంప కుళ్ళు                                      |



పొలంలో నిలచిన నీటిని  
బయటకు పంపివేయాలి

బోదెలపై లేదా బెడ్ లపై  
నాటుకోవాలి



# యాజమాన్య పద్ధతులు

- వర్షాలు ఆగిన వెంటనే 19:19:19 లేదా 13:0:45 లేదా యూరియా వంటి పోషకాలను పంటపై పిచికారి చేయాలి
- అవసరాన్ని బట్టి సూక్ష్మపోషకాలను కూడా పిచికారి చేసుకోవాలి



నేలకొంచెం ఆరిన తరువాత రసాయనిక  
ఎరువులను నేలలో వేసుకోవాలి



# యజమాన్య పద్ధతులు



అధిక వర్షాలకు విత్తనం మొలకెత్తనపుడు లేదా లేత మొక్కలు దెబ్బ  
తిన్నపుడు నర్సరీలో నారు పెంచుకుని సమయాన్ని ఆదాచేసుకోవచ్చు

# యజమాన్య పద్ధతులు



వర్షాలు ఆగిన వెంటనే అంతర సేద్యం చేసి కలుపును తొలగించడమే  
కాకుండా నేల త్వరగా ఆరేటట్లు చేసుకోవాలి

# యజమాన్య పద్ధతులు



మొక్కలకు ఊతం ఇవ్వడం, పందిళ్ళ పై తీగజాతి కూరగాయలను  
సాగు చేసుకోవడం

# సస్య రక్షణ చర్యలు

ఆకుతినే పొగాకు లద్దెపురుగు నివారణకు విషపు  
ఎరలను ఉపయోగించాలి (అన్ని కూరగాయ పంటలు)



అక్షింతల పురుగు, చిత్త పురుగుల నివారణకు వర్షాలు  
ఆగిన వెంటనే క్లోరిపైరిఫాస్ @ 2 మి.లీ/లీ లేదా  
థయోడికార్బ్ @ 1 గ్రా /లీ పిచికారీ చేసుకోవాలి  
(వంగ, కాకర, ఆగాకర)

# సస్య రక్షణ చర్యలు

ఎండు తెగులు నివారణకు కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్ @ 3  
గా ౨/లీ లేదా మెటాలాక్సిల్+ మంకోజెబ్ @ 2 గా ౨/లీ  
ను మొక్కల మొదళ్ళలో పోయాలి

(మిరప, టమాట, క్యాబేజి మొ. )



ఆకు మచ్చ తెగుళ్ళ నివారణకు కార్బండిజిం @ 1  
గా ౨/లీ లేదా మంకోజెబ్ @ 2.5 గా ౨/లీ ను పిచికారి  
చేసుకోవాలి

(మిరప, టమాట, చిక్కుడు, ఆకుకూరలు )

# సస్య రక్షణ చర్యలు

బూజు తెగులు నివారణకు డైమిథోమర్ప్ @ 1.5 గా ౨/లీ లేదా మెటాలాక్సిల్+  
మంకోజెబ్ @ 2.0 గా ౨/లీ ను పిచికారి చేసుకోవాలి

(బీర, కాకర, దోస, పొట్ల, సొర)



బాక్టీరియా మచ్చ తెగులు నివారణకు కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్ @ 3 గా ౨  
/లీ + ఫ్లాంటామైసిన్ @ 0.2 గా ౨/లీ కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి

(టమాట, వంగ, క్యాప్సికం)

# హార్మోన్ల వినియోగం

- ✓ నీటి ముంపు సమయంలో  $GA_3$  మరియు BAP పిచికారి చేసుకుని నీటి ముంపు ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు
- ✓ NAA @ 40 ppm పిచికారి చేసుకుని పూత పిందె రాలటం అరికట్టవచ్చు
- ✓ నేలలో తేమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సాలిసిక్ యాసిడ్ @ 100 ppm పిచికారి చేసుకుని మొక్కలో నిలువ ఉన్న పోషకాల వినియోగాన్ని పెంపొందించవచ్చు
- ✓ బ్రసినోలైడ్ @ 0.5 ppm పిచికారి చేసుకుని కిరణజన్యసం యోగ క్రియ పెంపొందించవచ్చు